

PROGRAMA SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES

RESUMEN DEL INFORME

ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES

Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga

COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN WAE

Entidad Coordinadora: Fundación WAE

Entidad Solicitante: Diputación de Barcelona

Año de realización: 2001



2001

¹ La Fundación WAE no se identifica necesariamente, ni se hace responsable, de las opiniones expresadas por los autores.



PRESENTACIÓN

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo. Inicialmente vinculada a ciertos colectivos, a medida que se han ido conociendo sus mecanismos de propagación y la realidad de los datos epidemiológicos, se ha constatado que ningún colectivo, ni nadie, es inmune a ella. No sólo eso, sus efectos, aunque progresivamente tratados de una manera más eficaz, son todavía hoy irreversibles. Ante ello, sólo cabe el desarrollar estrategias preventivas que a partir del conocimiento certero de los mecanismos de contagio permitan minimizar el riesgo sin alterar la vida social de las personas.

La información sobre el SIDA de la que se disponga será crucial para posicionarse de forma realista, sin desprecios ni alarmismos, frente a la enfermedad. Por otra parte, los conocimientos que se tengan de los mecanismos y vías de contagio permitirá, o no, mantener conductas seguras que reduzcan al mínimo el riesgo de contagio. Por último, el contexto en que se adquiere toda esta información, será fundamental para la valoración personal que sobre la misma se hace, y para su consolidación.

Ante cuestiones clave como las precedentes, disponer de los datos sociológicos que nos las revelen es imprescindible para llevar a cabo un proceso pedagógico que combata tanto la falta de información (desconocimiento) como las falsas creencias (desinformación). Conocer el grado de desconocimiento y de desinformación, y corregirlo es vital, puesto que en un tema como el SIDA, incurrir en una sola conducta de riesgo puede ser suficiente para su contagio.

Para conocer esos niveles de información y desinformación, y evaluar los conocimientos generales sobre la enfermedad así como aspectos más específicos de un colectivo concreto, el de los jóvenes estudiantes de bachillerato y formación profesional entre 14 y 20 años, la Unidad de Investigación de Fundación WAE ha realizado una muestra de 611 sujetos elegidos al azar entre los diferentes centros docentes donde posteriormente se han impartido charlas sobre la prevención de la enfermedad por parte de la Fundación WAE.



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

El objetivo del presente informe es exponer el resultado de la investigación llevada a cabo. En él se recogen los principales aspectos identificados, estructurados entorno a 3 niveles, sobre los que se desarrollará posteriormente y de forma adaptada a los resultados el proceso pedagógico de Fundación WAE:

- 1) CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA ENFERMEDAD

- 2) CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS DEL DAÑO
(vías de contagio, conductas de riesgo y medidas preventivas).

- 3) ENTORNO INFORMATIVO




CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL VIH Y EL SIDA

La primera parte del cuestionario se centra en cuestiones generales, relacionadas con el perjuicio que supone padecer la enfermedad del SIDA, cuál puede ser su alcance en el organismo y finalmente sobre los colectivos que pueden ser afectados de manera más directa. El interés de estas cuestiones radica en conocer cuales son los conocimientos generales que los jóvenes encuestados poseen previamente a cualquier proposición formativa acerca de la enfermedad. Así mismo, es importante la posición objetiva que los encuestados mantienen sobre el radio de acción de la enfermedad, para obtener información sobre concepciones estereotipadas socialmente sobre el SIDA y el nivel de gravedad de la misma en la población.

En esta primera parte del informe (así como en las subsiguientes) se hace imprescindible discernir entre la información de los jóvenes, reflejada en las respuestas correctas, la desinformación, traslucida en las respuestas erróneas, y la carencia objetiva de información, que revela la ausencia de respuesta.

La observación de los porcentajes globales obtenidos por los resultados de las variables utilizadas para conocer el conocimiento general de los jóvenes acerca del SIDA demuestra un alto grado de información genérica sobre ésta, ya que se infiere tan sólo un 4% del colectivo que no posee respuesta o prefiere no darla. El nivel de desinformación tampoco es demasiado elevado en lo que a aspectos generales de la enfermedad se refiere, ya que una media del 14% de los encuestados responde de manera equivocada a las cuestiones iniciales. Por lo tanto, el porcentaje más elevado se produce en las respuestas acertadas, que asciende, de media, al 81% de los sujetos entrevistados.

A continuación, reproducimos los diversos grados de información, desinformación y falta de información, respectivamente, que caracterizan a los jóvenes en el siguiente gráfico:




Como se ha mencionado anteriormente, en torno al 81% de los encuestados detecta la gravedad que implica el padecimiento del SIDA, y la posibilidad de estar infectado y desconocerlo. Esto demuestra que existe una información generalizada sobre los aspectos más tópicos y triviales de la enfermedad, como son sus características y manifestaciones (Ej. Los efectos del SIDA, las posibilidades de curación o el momento de detectar su existencia). Por ejemplo, la pregunta de si el VIH afecta a las defensas del organismo humano o la pregunta de la posibilidad de estar infectado y desconocerlo, alcanzan niveles de acierto de hasta un 90%. Por el contrario, se pueden subrayar algunos matices en cuanto a cuestiones puntuales, en las que los jóvenes no tienen una información tan clara como en otras diversas. Esencialmente, destacan las cuestiones referidas a la propia enfermedad en sí y al virus, en las que se observa un menor porcentaje de respuestas afirmativas en cuanto a la distinción sobre ambas.

Como puede apreciarse en el gráfico, existe todavía un grado de desinformación importante acerca de la diferencia entre ser solamente portador del virus y contraer la enfermedad. Se da un porcentaje de un **15% entre los encuestados que no relacionan que la enfermedad del SIDA afecte a los portadores del VIH**, y uno de cada diez no sabe qué responder.



PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001



ACIERTOS	468	77%
DESINFORMACION	91	15%
FALTA DE INFORMACION	52	9%


La cuestión más sobresaliente en cuanto a desinformación por parte de los encuestados es la que se refiere al **período de tiempo** que cada individuo necesita **para conocer si se ha infectado de la enfermedad**. Esto se debe a que un 54% de los jóvenes sabe que un análisis de sangre al día siguiente de un posible contagio no permitiría saber si se ha contraído la enfermedad, frente a un 40% de los mismos, porcentaje bastante elevado, que contesta afirmativamente a esta cuestión. Todo ello demuestra que todavía existe un número sobresaliente de sujetos, cercano a la mitad de los encuestados, que carece de información sobre el tiempo necesario para obtener una prueba fiable del contagio del VIH.



PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas sobre la posibilidad de obtener mediante una prueba analítica resultados fiables de la existencia o no de contagio por VIH.

- *Puede saberse si hay contagio al día siguiente de haber mantenido una relación sexual de riesgo?*



ACIERTOS	329	54%
DESINFORMACIÓN	244	40%
FALTA DE INFORMACION	38	6%

4 de cada 10 jóvenes cree que puede detectarse el contagio al día siguiente mismo de haber mantenido una relación sexual de riesgo, mientras que algo más de la mitad de ellos piensa lo contrario.

Otro dato a destacar, es el que se refiere a los **colectivos afectados** por la enfermedad. La opinión de los encuestados, es mayoritariamente en un 87% acertada en cuanto a que el SIDA puede afectar a cualquier colectivo, pero se destaca **un 12% de los jóvenes que todavía mantienen una visión estereotipada de los colectivos a los que creen que la enfermedad puede afectar**




PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

exclusivamente. Dentro de este porcentaje, se observa que los encuestados señalan únicamente algunos colectivos tradicionalmente marginales en la sociedad expuestos a contraer la enfermedad como son las prostitutas, los homosexuales, los drogadictos, la gente de menores recursos e incluso inmigrantes, considerando en concreto que son los drogadictos y las prostitutas los colectivos de mayor riesgo.

De este modo, se pone de manifiesto entre algunos jóvenes la creencia de que el SIDA es una enfermedad que aunque puede afectar a los heterosexuales, representa una amenaza mucho mayor para determinados colectivos, tan sólo unos pocos, etiquetados socialmente como “excluidos”. Frente a estos destaca el bajo porcentaje de respuestas obtenidas por los artistas y gente mayor, un 2% y un 4% respectivamente. Es significativo así mismo, que **solo uno de cada cuatro de estos jóvenes opina que es su colectivo uno de los afectados.**

En el siguiente gráfico se reproducen los colectivos indicados en el cuestionario, y el porcentaje de jóvenes que considera en cada uno de ellos, respectivamente, una mayor exposición a contraer la enfermedad:





PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

HOMOSEXUALES	57%
DROGADICTOS	86%
PROSTITUTAS	83%
HETEROSEXUALES	36%
GENTE MAYOR	4%
SOLTEROS /AS	10%
POBRES	25%
ARTISTAS	2%
JOVENES	26%
INMIGRANTES	28%
NS /NC	12%



PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

Se demuestra a raíz de las respuestas analizadas en el primer apartado del cuestionario, que los jóvenes consultados poseen una serie de ideas generales sobre la enfermedad del SIDA, aunque todavía persisten algunos conocimientos difusos acerca de la diferenciación entre ser portador del virus y desarrollar la enfermedad, el tiempo necesario para conocer si se ha resultado contagiado (el llamado ‘periodo ventana’, crucial para evitar el contagio a terceras personas y por tanto su propagación), así como sobre los colectivos que pueden encontrarse expuestos al contagio del VIH.

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CAUSAS DEL DAÑO


La segunda parte del cuestionario se centra en cuestiones más concretas de la enfermedad, que se pueden resumir en tres categorías diferentes: las vías de transmisión del SIDA, las medidas más usuales para prever la posibilidad de infectarse, y el conocimiento de los encuestados sobre las conductas de riesgo más significativas para exponerse al contagio. Ahondar en estas cuestiones más específicas es fundamental con el objetivo de medir el grado de dominio que los jóvenes poseen acerca de aspectos trascendentes de la enfermedad, es decir, no sólo su manifestación y aspectos generales, sino el modo en que puede transmitirse y las fórmulas que social e individualmente se pueden llevar a cabo para evitarla de modo eficaz.

En esta segunda parte se mantiene el interés por percibir los grados de información, desinformación y carencia objetiva de información del colectivo.

La primera conclusión que podemos sacar es que el nivel de preguntas correctas es similar al del primer apartado. Sin embargo, la diferencia estriba entre los niveles de desinformación y falta de información que varían con respecto al apartado anterior, como se muestra a continuación:



GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DEL CONTAGIO



Se puede comprobar como el número de fallos desciende sustancialmente con respecto al anterior bloque, mientras que las preguntas de NS/NC se incrementan en el mismo porcentaje que la desinformación baja. Si en el primer apartado la desinformación cuadruplicaba a la falta de información, en éste, los niveles de una y otra se asemejan. Incluso en muchas de las preguntas, el número de respuestas no obtenidas es sensiblemente superior a la de las respuestas erróneas, llegando incluso en una de las preguntas hasta un 30% de no respuestas.


En cuanto a la primera categoría observada, **el conocimiento sobre las vías de transmisión del SIDA**, globalmente los encuestados demuestran tener una información bastante elevada sobre cuáles son las que realmente implican un riesgo, ya que el porcentaje de sujetos que han dado respuestas correctas a estas cuestiones, asciende a un 77,2% de los mismos. Sin embargo, en este



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

apartado, se observa que la falta de información supera a la información incorrecta que los encuestados poseen; debido a que un porcentaje del 13,3% de los jóvenes no sabe o no contesta a estas cuestiones, mientras que tan sólo un 9,7% responde incorrectamente. Se puede inferir que preguntas más concretas sobre la enfermedad reflejan que los jóvenes carecen todavía de una información muy exhaustiva sobre aspectos más complejos de la información, ya que son capaces de dar respuesta a las cuestiones planteadas, pero de modo erróneo.


A continuación, reproducimos los diversos grados de información, desinformación y ausencia de la misma, proporcionalmente, que poseen los jóvenes sobre las vías de transmisión de la enfermedad. En el siguiente gráfico se refleja el porcentaje de jóvenes que han dado respuestas correctas, erróneas y que no sabían o no han contestado a todas las cuestiones referidas a las vías de transmisión de la enfermedad del SIDA:



Estos porcentajes contrastan con las preguntas referidas al *riesgo de contagio*, como bien ilustraremos a través de este gráfico:



GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO




Comparativamente hablando se detecta un mayor número de preguntas acertadas que en el apartado de las vías de transmisión. Sin embargo, el dato más llamativo son las diferencias existentes entre preguntas no contestadas de uno y de otro. Mientras en las preguntas referidas a conductas de riesgo las **respuestas no contestadas** apenas alcanzan un 3%, en la **de las vías de transmisión llegan a ser de un 13%**, siendo incluso superiores a la de los fallos.

Aún así, las mayores diferencias entre las preguntas las hallamos particularmente a las referidas a las vías de transmisión. Podría hablarse de un conocimiento generalizado en cuestiones que son tratadas ampliamente por los medios de comunicación y opinión pública. Así alrededor de un 90% de los jóvenes han sabido responder acertadamente en las cuestiones como: riesgo de contagio por tacto, vía contagio de mujer embarazada a su futuro hijo o existencia de riesgo por compartir jeringuilla (sin ir más lejos esta pregunta ha sido respondida afirmativamente por un 96% de los encuestados). Sin embargo, en otras preguntas precisan un conocimiento más exhaustivo del tema, se detecta una mayor confusión:



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

-Una picadura de mosquito es una posible vía de transmisión de la enfermedad.



ACIERTOS	286	47%
DESINFORMACIÓN	146	24%
FALTA DE INFORMACION	179	29%


En cuanto a picaduras se refiere, un **25 % de los encuestados cree que puede contagiarse por la picadura de un insecto** y **casi un 30% no sabe** si se puede contagiar o no.

En otra de las preguntas también se evidencia cierta confusión, aunque en menor grado que la anterior. Es en la referida a “donación de sangre”, **3 de cada 10 jóvenes no están seguros de que donar sangre en un centro sanitario sea totalmente seguro:**

-Donar sangre en un centro sanitario/ hospital comporta riesgo de contagio?



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001



ACIERTOS	437	72%
DESINFORMACIÓN	102	17%
FALTA DE INFORMACION	72	12%

En lo que se refiere a la segunda categoría, **las medidas preventivas**, se ha observado que los encuestados conocen en un 96% la efectividad del uso del preservativo, aunque también se observan otros porcentajes destacables, que demuestran cierta desinformación. Es representativo de esta cuestión, **casi la mitad de los jóvenes considera el sexo oral como medida preventiva en caso de carecer de preservativo.**

También se destaca que **el 16% de los encuestados considera los anticonceptivos orales como una medida preventiva fiable para evitar el contagio del virus**, lo cuál demuestra que existe un porcentaje estimable de jóvenes que se fían de un método que no ofrece ninguna prevención en cuanto a la enfermedad del SIDA. Además, existe un **10% de jóvenes que afirman que lavarse**



PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

bien tras mantener una relación sexual puede servir de medida preventiva, lo cual evidencia que al menos en ese porcentaje de los encuestados existe una clara desinformación sobre los métodos preventivos.

De este modo, en términos generales, se ha podido observar un conocimiento unánime del uso del preservativo como método preventivo más fiable contra las posibilidades de contraer la enfermedad, aunque todavía existe un porcentaje de jóvenes destacable que además del citado, consideran erróneamente otros métodos como fiables para prevenir el contagio de la enfermedad.

En el siguiente gráfico se refleja la importancia que atribuyen los jóvenes a las diferentes medidas a la hora de reducir el riesgo de infección:



PILDORA ANTICONCEPTIVA	16%
UTILIZAR PRESERVATIVO	96%
LAVARSE BIEN DESPUÉS DE MANTENER RELACIÓN SEXUAL	10%
REALIZAR SEXO ORAL EN CASO DE NO TENER PRESERVATIVO	44%
NO SABE O NO CONTESTA	2%




Teniendo en cuenta que el conocimiento de las medidas preventivas es una cuestión de fundamental importancia para evitar el riesgo de contagio del virus del SIDA, es evidente la confusión que demuestran respecto a éstas. A pesar de manifestar que el preservativo es la más eficaz, el nivel de desinformación respecto al resto de cuestiones planteadas es alarmante.

ENTORNO INFORMATIVO

En esta última parte de la encuesta, se han tratado cuestiones relacionadas con el perfil de los propios encuestados, entre las que figuran sus opiniones y situación personal frente al tema de la enfermedad del SIDA.

La primera conclusión que puede extraerse, es que **6 de cada 10 jóvenes afirman no tener información o desconocen realmente si la tienen.**

En referencia al grado de información de los jóvenes en este último apartado, se observa que ellos mismos son conscientes de que sufren carencias informativas sobre el tema, ya que **son únicamente cuatro de cada diez jóvenes los que creen que estar suficientemente bien informados.** En términos porcentuales, esto representa a un 43% de los encuestados, aunque todavía persiste un 24% que se considera poco informado, y un 33% que no sabe o no contesta a esta cuestión.






PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

ESTOY BIEN INFORMADO	260	43%
DESINFORMACIÓN	149	24%
FALTA DE INFORMACION	202	33%

A la pregunta de si están lo suficientemente informados, se le ha añadido otra acerca de si sabrían decir a dónde podrían acudir en caso de querer informarse y los datos obtenidos se asemejan bastante a la del nivel de información. Casi la mitad de los encuestados, el 48% ha sabido responder a la pregunta, destacando fundamentalmente los centros de planificación y centros sanitarios. No obstante, mayor trascendencia adquiere el hecho de que **más de la mitad de los jóvenes(52%) no sabe donde acudir:**





PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

SABE DONDE ACUDIR	293	48%
FALTA DE INFORMACIÓN	264	43%
DESINFORMACIÓN	54	9%

En primer lugar, respecto a la facilidad para hablar de sexo, todavía persiste entre los jóvenes el dar importancia a las relaciones más cercanas y estrechas y que les inspiren mayor confianza, a la hora de tratar esta cuestión. Mayoritariamente, **son los amigos, en un 89% de los casos, con quienes los jóvenes tienen más facilidad para hablar de sexo**, seguido de la familia, con los hermanos en un 29% de los casos, y los padres, en un 25%. Los profesores alcanzan el porcentaje de tan sólo un 10% de los encuestados, no representan un referente claro aún entre los jóvenes para hablar de este tema. La pareja sería la opción más repetida en la respuesta “otros”.





PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Polítólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

AMIGOS	546	89%
PADRES	155	25%
HERMANOS	176	29%
PROFESORES	60	10%
NADIE	21	3%
OTROS	108	18%
NS /NC	9	1%

Sin embargo estos datos contrastan cuándo a estos escolares se les ha preguntado por ***a quién han oído hablar de SIDA.*** Así, mientras uno de cada cuatro encuestados afirma hablar de sexo con sus padres, en el caso del SIDA alcanza hasta un 62% de respuestas quienes afirman que han oído hablar a sus padres de la enfermedad. Pero, mayor significación adquiere el hecho de que **mientras sólo uno de cada diez jóvenes afirma haber hablado con los profesores de sexo, estos mismos reconocan en un 73% que sus profesores les han hablado del SIDA.** Este dato es curioso, ya que el SIDA está muy relacionado con el tema de las relaciones sexuales. De cualquier manera el hecho a destacar es que **más de 9 de cada 10 jóvenes han oído hablar de la enfermedad de forma indirecta** (TV, Radio), un porcentaje bastante considerable si lo comparamos con las opciones restantes, tanto sus allegados más próximos como por el de sus profesores:



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001




AMIGOS	69%
PADRES	62%
HERMANOS	26%
PROFESORES	73%
TV/RADIO	93%
LIBROS/ REVISTAS	77%
MEDICO	25%
OTROS	10%
NS/ NC	1%
NADIE	1%



PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

Finalmente, se les ha preguntado quién o quienes creen ellos que debieran ser las personas adecuadas para informarles sobre este tema, y el **centro docente es la institución elegida por casi 7 de cada 10 alumnos**, mientras que el médico reúne también un alto porcentaje de las preferencias de estos jóvenes, en torno a algo más de 5 de cada 10 alumnos:

PADRES	39%
CENTRO DOCENTE	66%
MEDICO	56%
OTROS	11%
NS /NC	2%





PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

CONCLUSIONES:

A modo de conclusión, se puede decir que hay una gran confusión entre los jóvenes en torno a este tema, ya que más de la mitad de los encuestados no puede afirmar estar bien informado, el 25 % dice no estar todo lo informado que debería y un 33% tiene dudas respecto a su nivel de conocimiento sobre la enfermedad. Estas dudas se traducen en unos datos bastante alarmantes: en cuanto a medidas preventivas, un 10% de los jóvenes cree que lavarse bien después de mantener relaciones sexuales es suficiente para no contagiarse, un 16% piensa en utilizar la píldora anticonceptiva y casi la mitad de los encuestados propone practicar sexo oral para evitar el contagio. Campañas como el “Póntelo ,Pónselo” son necesarias, pero no suficientes, como demuestra este estudio, el SIDA requiere una tarea de formación continua y más especializada, y esta tarea formativa es asignada por ellos mismos a los centros docentes y profesorado, así como a centros médicos, personas con cierta cualificación o especialización en el tema según definen estos jóvenes. A pesar de que se mantenga la proximidad familiar y las amistades para tratar estos temas como un modo más informal de intercambio de conocimientos, son los centros anteriormente citados a los que se atribuye la capacidad para llevar a cabo esa labor.



PROGRAMA DE SALUD PREVENITVA PARA JÓVENES
RESUMEN DEL INFORME
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR VIH EN ADOLESCENTES
Autores: Enric Barcena, Politólogo y Nerea Olasagasti, Socióloga – Entidad Coordinadora: Fundación WAE
Año de realización 2001

FICHA TÉCNICA

Realización del trabajo de campo : SEPTIEMBRE /DICIEMBRE 2000

Ámbito geográfico: PROVINCIA DE BARCELONA (Excepto Barcelona ciudad)

Recogida de información: MEDIANTE ENCUESTAS

Universo de análisis: POBLACIÓN ENTRE 14 – 18 AÑOS.

Tamaño de la muestra: 611 ENCUESTAS.

Error muestral: El error muestral para el total de la muestra es de + 3,48% para un margen de confianza del 95,5%.

Procedimiento de muestreo: UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (COLEGIOS-INSTITUTOS) SELECCIONADAS DE FORMA ALEATORIA: 10 IES PROVINCIA BARCELONA

Agradecimientos:

Agradecemos a todos los Institutos de Enseñanza Secundaria que han participado en este estudio su inestimable colaboración.

Nerea Olasagasti y Enric Barcena; los autores